薬袋サンプル



内服薬
調剤日:H26/11/11

ヤクタイ サンプル 薬袋 サンプル 様

1日1回 朝食後に

14日分

1回各1錠 パファリン配合錠A330 330mg アムロジン錠50mg ラシックス錠20mg アイトロール錠10mg

株式会社Windy
下812-0013 福岡市博多区博多駅東2-8-9ソフィアビル304
TEL:092-474-1007 FAX:092-474-1008

ご質問などございましたらお気軽にご連絡ください。

ID:00000105 1/29 薬袋 サンプル 様 調剤日:H26/11/11 内服薬 1日1回 14日分 朝食後に このお楽は、痛みや炎症を抑え、熱を下げる薬です。 バファリン配合錠A330 330mg 起朝昼夕 過度の体温下降、虚脱、四肢冷却等の症状が あらわれた場合は主治医に連絡してください。 1回 1錠 このお薬は、血管を拡げて血圧を下げる薬です。 アムロジン錠5mg 起朝屋夕 血圧低下によりめまい等があらわれることがありますので、車の運転や危険のともなう機械の操作 等には十分に気を付けてください。 1回1錠 ラシックス錠20mg 起朝昼夕寝 血圧低下によりめまい等があらわれることがありま すので、車の運転や危険のともなう機械の操作 等には十分に気を付けてください。 1回 1錠 アイトロール錠10mg このお薬は、狭心症の薬です。 起朝 タ寝 アルコール類は、血圧低下を増強させることがあり ますので避けてください。 1回 1錠

株式会社Windy

THE 113 -011 14

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-8-9ソフィアビル304 TEL:092-474-1007 FAX:092-474-1008 ご質問などございましたらお気軽にご連絡ください。

1/30 デモ 一包化 様 調剤日:H26/11/11 内服薬 1日1回 28日分 朝食後 このお薬は、血栓(血の固まり)ができるのを抑える薬です。 バファリン配合錠A81 81mg 起朝昼夕寝 服用時には、アルコール類を飲むことは避けてください。 1回 1錠 このお薬は、血管を拡げて血圧を下げる薬です。 アムロジン錠5mg 起朝昼夕寝 血圧低下によりめまい等があらわれることがありますので、車の運転や危険のともなう機械の操作等には十分に気を付けてください。 1回 1錠 ラシックス錠20mg 起朝屋夕寝 血圧低下によりめまい等があらわれることがありま すので、車の運転や危険のともなう機械の操作 等には十分に気を付けてください。 1回 1錠 このお薬は、狭心症の薬です。 アイトロール錠10mg 1回 1錠

ID:00000108

株式会社Windy

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-8-9ソフィアビル304 TEL:092-474-1007 FAX:092-474-1008 ご質問などございましたらお気軽にご連絡ください。

手帳サンプル

F812-00	社Windy 013 福岡市博多区博多駅東2 ⁻ -474-1007 FAX:092-474-100 どございましたらお気軽にご連絡・	08
ロキソニ	ン錠60mg に	1回 1錠 14日分
-	四肢冷却等の症状があらわれたさい。	場合は主治医に連絡してくた
S·M酒 毎食後		1回 1g 14日分
	大量の牛乳や高カルシウム食品ださい。	との併用は避けるようにして
カロナー発熱時	-ル錠200 200mg 記	1回 1錠 5回分
	服用時には、アルコール類を飲む	ひことは遊けてください。
Contraction Contraction	- 軟膏0.05% 指示通りに	
	使用方法については、主治医ま 使用してください。	たは薬剤師に確認の上、正し
1	コンーVG軟膏O. 12% D指示通りに	
		等があらわれた場合は、主治

<u>干帳 サンノル 休</u> 株式会社 Windy 福岡市博多区博多駅東2-8-9-3	04 TEL:0	H26/11/11 TEL:092-474-1007			
ロキソニン錠60mg 毎食後に	起	朝	昼	夕 1	寝
14日分		錠	錠	錠	Charles
1回 1錠 1日 3錠	全 4	2錠			
^包 S·M配合散	起	朝	昼	9	寝
毎食後に 14日分		1 包	1 包	1 包	
1回 1g 1日 3g	全 4	2g	-		
カロナール錠200 200mg 発熱時に 5回分		1回1錠			
1回 1錠	全 5	錠			
マイザー軟膏0.05% 医師の指示通りに		5g			
混合 1 0 リンデロンーVG軟膏0. 12%	全 5	g			
0 リンデロンーVG軟膏0. 12% 医師の指示通りに	5	5g			
9	全 5	全 5g			

OOOOOOEO

帳 サンプル 様	ID:00000059 H26/11/11
式会社Windy 12-0013 福岡市博多区博 .:092-474-1007	多駅東2-8-9-304
ロキソニン錠60mg	1日 3錠
毎食後に	14日分
1回 1錠	全 42錠
S·M配合散	1日 3g
毎食後に	14日分
1@ 1g	全 42g
カロナール錠200 200m	g
発熱時に	5回分
1回 1錠	全 5錠
マイザー軟膏0. 05% 医師の指示通りに	全 5g
リンデロンーVG軟膏0. 12 医師の指示通りに	
	全 5g

薬情サンプル

デモ ヤクジョウ **デモ 薬情 様**

ID:00000117 H26/11/11

バファリン配合錠A81 81mg



起	朝	昼	タ	寝
	1		1	
	錠		錠	

このお薬は、血栓(血の固まり)ができるのを抑える薬です。

服用時には、アルコール類を飲むことは避けてください。

朝夕食後に

28日分

1日 2錠

1回 1錠

全 56錠

アムロジン錠5mg



起	朝	昼	タ	寝
	1		1	
	錠		錠	

このお薬は、血管を拡げて血圧を下げる薬です。

血圧低下によりめまい等があらわれることがありますので、 車の運転や危険のともなう機械 の操作等には十分に気を付けてください。

朝夕食後に

28日分

1日 2錠

1回 1錠

全 56錠

ラシックス錠20mg



11118				
起	朝	昼	タ	寝
	1		1	
	錠		錠	

このお薬は、体内にある余分な水分を排出させて血圧を下げ、浮腫(むくみ)をなくす薬です。

血圧低下によりめまい等があらわれることがありますので、車の運転や危険のともなう機械 の操作等には十分に気を付けてください。

朝夕食後に

28日分

1日 2錠

1回 1錠

全 56錠

アイトロール錠10mg



起	朝	昼	9	寝
	1		1	
	錠		錠	

このお薬は、狭心症の薬です。

アルコール類は、血圧低下を増強させることがありますので避けてください。

朝夕食後に

28日分

1日 2錠

1回 1錠

全 56錠

アルダクトンA錠25mg



起	朝	昼	タ	寝		
- 1000	2		2			
	錠		錠			

このお薬は、体内にある余分な水分を排出させて血圧を下げ、浮腫(むくみ)をなくす薬です

血圧低下によりめまい等があらわれることがありますので、車の運転や危険のともなう機械 の操作等には十分に気を付けてください。

朝夕食後に

28日分

1日 4錠

1回 2錠

全 112錠

カロナール錠200 200mg



1回1錠

このお薬は、痛みを和らげ熱を下げる薬です。

服用時には、アルコール類を飲むことは避けてください。

発熱時に

1回分

1回 1錠

全 1錠

モーラステープL40mg 10cm×14cm



このお薬は、痛みや炎症を抑える薬です。

モーラステーフ1 40㎡ 49枚

傷口や粘膜等には使用しないでください。

1日2回お使い下さい。 全 49枚

株式会社Windy

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-8-9ソフィアビル304

TEL:092-474-1007 FAX:092-474-1008

ご質問などございましたらお気軽にご連絡ください。